

# КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19



## БЕЗОПАСНОСТ

Науката е категорична, че ваксините срещу COVID-19 са безвредни и безопасни. Ваксините са преминали успешно клинични изпитвания. Доказано те отговарят на всички изисквания за качество, безопасност и ефикасност.

По света вече са имунизирани над 2,7 млрд. души.



## СИГУРНОСТ

Ваксините са сигурни и ефективни срещу тежко протичане на заболяването и възможни сериозни последици за здравето Ви.



## ЗАЩИТА

Ваксинирането дава индивидуална защита. С постигане на висок дял на ваксинирани от населението се ограничава разпространението на COVID-19.

Целта е да се постигне поне 70% Ваксинация на населението.

## МОЖЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ, АКО ВЕЧЕ СТЕ ПРЕБОЛЕДУВАЛИ!

Дори да сте преболедали, съществува риск от повторна инфекция. Все още няма категорични данни колко дълго продължава т. нар. „естествен имунитет“.



## ЕФИКАСНОСТ

Ваксината е ефикасна след завършен курс на ваксинация. За да бъде завършен напълно ваксинационният курс и да получите сертификат, Ваксините се поставят, както следва:

- **PFIZER/BIONTECH (COMIRNATY)** - най-рано 21 дни след поставяне на първа доза Ваксина се поставя втора. Прилага се на лица на възраст 12 и повече години.
- **MODERNA** - най-рано 28 дни след поставяне на първа доза Ваксина се поставя втора. Прилага се на лица на възраст 18 и повече години.
- **ASTRAZENECA (VAXZEVRIA)** - между 28 и 84 дни след поставяне на първа доза Ваксина се поставя втора. Прилага се на лица на възраст 18 и повече години.
- **JANSSEN** - поставя се еднократно. Прилага се на лица на възраст 18 и повече години.

Може да получите втора доза Ваксина (за ваксините с двугозов прием) във всеки имунизационен пункт, при личния Ви лекар или във временен мобилен пункт.



## ДОСТОВЕРНОСТ

Препоръчително е да се информирате за ваксините срещу COVID-19 само от достоверни източници, като:

- Министерството на здравеопазването
- Изпълнителната агенция по лекарствата
- Националният център по заразни и паразитни болести
- Европейската агенция по лекарствата
- Европейският център за контрол и превенция на заболяванията и т.н.

**ПРИ НАЛИЧИЕ НА ХРОНИЧНО ИЛИ ДРУГ ВИД ЗАБОЛЯВАНЕ СЛЕДВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ЛЕКАР ПРЕДИ ИМУНИЗАЦИЯТА.**



### РЕАКЦИИ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ

Лекарствените реакции след имунизация, като отпадналост, болка в мускулите, главоболие, зачервяване на мястото на инжекцията, висока температура, са нормални и преминават бързо. Обикновено те се появяват веднага след ваксинацията и преминават за часове. Тези симптоми показват, че имунната система отговаря на ваксината и създава антитела срещу вируса.



Голяма част от ваксинираните не проявяват никаква симптоматика след имунизация.



В случай на неочаквана странична реакция, уведомете лекар. Можете да подадете сигнал чрез формуляра на официалната интернет страница на Изпълнителната агенция по лекарството и на телефон 02 890 3417.